

# Impfkalender

für Säuglinge, Kinder und Jugendliche im Alter von

## 6 Lebenswochen

- Rotaviren (Schluckimpfung) 1. Impfung

## 2 Monaten

- Diphtherie-Tetanus-Pertussis (DTaP)
  - Poliomyelitis (Kinderlähmung), Haemophilus Influenzae b (Hib, Hirnhautentzündung), Hepatitis B
  - Pneumokokken
- Auch: kombiniert als 6fach-Impfung*

## 3 Monaten

- Rotaviren (Schluckimpfung) 2. Impfung
  - Diphtherie-Tetanus-Pertussis (DTaP)
  - Pneumokokken
- Auch: 6fach-Impfung wie 2. Monat*

## 4 Monaten

- Diphtherie-Tetanus-Pertussis (DTaP) 3. Impfung
  - Poliomyelitis (Kinderlähmung) 2. Impfung
  - Haemophilus Influenzae b (Hib, Hirnhautentzündung) 2. Impfung
  - Hepatitis B 2. Impfung
  - Pneumokokken
- Auch: 6fach-Impfung wie 3. Monat*

## 6 Monaten

- Rotaviren (Schluckimpfung) gegebenfalls 3. Impfung



## 11 – 14 Monaten

- Diphtherie-Tetanus-Pertussis (DTaP) 4. Impfung
  - Poliomyelitis (Kinderlähmung) 3. Impfung
  - Haemophilus Influenzae b (Hib, Hirnhautentzündung) 3. Impfung
  - Hepatitis B 3. Impfung
  - Pneumokokken
- Auch: 6fach-Impfung wie 3. Monat*
- Masern-Mumps-Röteln (MMR) 1. Impfung
  - Varizellen (Windpocken) mit MMR oder frühestens vier Wochen danach

## 15 – 23 Monaten

- Masern-Mumps-Röteln (MMR) 2. Impfung
- Meningokokken (bis vollendetem 2. Lebensjahr)
- Varizellen (Windpocken) 2. Impfung

## 5 – 6 Jahren

- Pertussis (aP) Auffrischimpfung
- Tetanus-Diphtherie (Td) Auffrischung mit verringerter Diphtherie-Dosis

## 9 – 17 Jahren

- Poliomyelitis (Kinderlähmung) Auffrischimpfung
  - Tetanus-Diphtherie (Td) Auffrischung mit verringerter Diphtherie-Dosis
  - Pertussis (aP) Auffrischimpfung
- Auch: kombiniert als 4fach-Impfung*
- Hepatitis B für ungeimpfte Kinder und Jugendliche
  - Varizellen für ungeimpfte Kinder und Jugendliche, die nie an Windpocken erkrankt waren
  - Humane Papillomaviren (Gebärmutterhalskrebs) für Mädchen im Alter von 12–17 Jahren