IMPFKALENDER

Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.
Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll. Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission
(STIKO), Januar 2025. www.stiko.de

IMPFUNG \ ALTER	in Wochen				in Monaten						in Jahren							
	6	2	3	4	5–10	11*	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16	17	ab 18	ab 60
		U4			U5	U6				U7	U7a, U8	U9	U10	U11, J1		J2		
Rotaviren Brechdurchfall	G1[a]		G2	(G3)														
Tetanus[b] Wundstarrkrampf		G1	N	G2	N	G3[c]	N					A1	N	A2		N	A[f]	
Diphtherie[b] Echter Krupp		G1	N	G2	N	G3[c]	N					A1	N	A2		N	A[f]	
Pertussis[b] Keuchhusten		G1	N	G2	N	G3[c]	N					A1	N	A2		N	A3[f]	N
Haemophilus influenzae Typ b[b] Hib		G1	N	G2	N	G3[c]	N											
Poliomyelitis[b] Kinderlähmung		G1	N	G2	N	G3[c]	N							A1		N		
Hepatitis B[b] Leberentzündung Typ B		G1	N	G2	N	G3[c]	N											
Streptococcus pneumoniae[b] Pneumokokken		G1	N	G2	N	G3[c]	N											S[h]
Neisseria meningitidis B[d] Meningokokken B		G1	N	G2	N		G3[c]											
Neisseria meningitidis C Meningokokken C							G1	N										
Morbilli Masern						G1	N		G2	N							S[g]	
Parotitis epidemica, Rubeola Mumps, Röteln						G1	N		G2	N								
Varizellen Windpocken						G1	N		G2	N								
Humane Papillomviren HPV											G1[e] G2[e]			N				
Herpes Zoster Gürtelrose																		G1[i] G2[i]
Influenza Grippe																		S Jährlich
COVID-19																	G[j]	S[j]

Erläuterungen

- **G** GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 3 Teilimpfungen G1–G3)
- **S** STANDARDIMPFUNG
- **A** AUFFRISCHIMPFUNG
- **N** NACHHOLIMPFUNG (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
- **U** Früherkennungsuntersuchung
- **J** Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12–14 Jahren)

a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen.

b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d.h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.

c Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate.

d 3 Dosen im Alter von 2 bis 23 Monaten, ab 24 Monaten besteht die Impfserie aus 2 Dosen.

e Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahren oder bei Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich.

f Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung 1-malig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

g Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.

h Impfung mit PCV20

i Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten.

j Für den Schutz von Personen ohne Grunderkrankung sind (mindestens) 3 Antigen-Kontakte nötig, davon mindestens 1 als Impfung.

* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden.
MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.

Quelle: STIKO, 2025